



## Wysiężkowe zapalenie ucha

Wysiężkowe zapalenie ucha – to rozpoznanie oznacza obecność wysięku w uchu środkowym. W zależności od rodzaju wysięku i czasu jego trwania przebieg choroby jest różny.

Głównymi skargami zgłaszanymi przez starsze dzieci są: niedosłuch, szum w uchu, uczucie przelewania się płynu w uchu, uczucie zatkania ucha. U młodszych dzieci głównym objawem jest niedosłuch, mogą występować zaburzenia mowy, zaburzenia zachowania, dzieci mogą głośno mówić lub zwiększać głośność w telewizorze. U niemowląt przebieg może być skryty i schorzenie wykrywane jest za pomocą badań przesiewowych lub manifestuje się opóźnieniem rozwoju mowy. Choroba ma zmienny przebieg z tendencją do spontanicznego wchłaniania się wysięku. Stąd tzw. niedosłuch fluktuacyjny – obserwuje się poprawy słuchu i ponowne pogorszenia.

Niedosłuch najczęściej wykrywa się w badaniu laryngologicznym podczas oceny błon bębenkowych oraz stosując badanie tympanometryczne oceniające stan ucha środkowego.

Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za powstanie wysięku w uchu środkowym są nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych, alergie, zaburzenia drożności trąbki słuchowej. Dość duży związek występuje z rozszczepem podniebienia. Również przerost migdałka gardłowego zaburzający drożność trąbki słuchowej odgrywa dużą rolę w powstawaniu wysięku. Większość epizodów choroby ma krótki przebieg, jednak część przypadków przebiega jako uporczywa choroba trwająca dłużej niż rok. W leczeniu duże znaczenie ma usunięcie migdałka gardłowego, przedmuchiwanie trąbek słuchowych oraz podniesienie ogólnego stanu odporności.

**Lek. med. Ewa Kotwicka - Ulbrych**

specjalista otolaryngolog - audiolog

LUBUSKIE CENTRUM LARYNGOLOGII LCL NS ZOZ

Zielona Góra

Ul. Gen. M. Langiewicza 37

Rejestracja: tel. 068/3299781,3250898, APARATY SŁUCHOWE: 068/3299783

e-mail : [lcl@lcl-laryngolog.pl](mailto:lcl@lcl-laryngolog.pl)

www: <http://www.lcl-laryngolog.pl>